

Enero 2026

Final Emitido el 11/10/2026 · Normal 1991-2020 · próxima actualización 12/10/2026

1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media nacional de 17.0 °C (+1.1 °C respecto a 1991-2020): el 2.º enero más cálido de la serie 1979-2026.
- Precipitación nacional de 24.4 mm, 90 % de lo normal: el 26.º enero más seco de la serie 1981-2026.
- La temperatura máxima más alta en estaciones GHCN fue de 33.5 °C en Francisco Sarabia, Chis. el 25 de enero.
- La temperatura máxima superó su percentil 90 en el 32 % de los días (promedio nacional; lo esperado es 10 %).
- Ondas de calor de alcance nacional: 1; ondas frías: 0.
- El 15 % del país presentó sequía según el SPI-3 (Nov 2025-Ene 2026), sobre todo en Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México.
- Condiciones de La Niña de intensidad débil en el Pacífico ecuatorial (ONI NDJ 2026: -0.6 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL, UCSB Climate Hazards Center

Temperatura media

17.0 °C

+1.1 °C vs. normal (normal 15.9)

Por encima de la norma

2.º más cálido de 48 (1979-2026)

Temperatura máxima

24.3 °C

+2.1 °C vs. normal (normal 22.2)

En extremo por encima de la norma

1.º más cálido de 48 (1979-2026)

Temperatura mínima

9.7 °C

+0.0 °C vs. normal (normal 9.6)

Normal

16.º más cálido de 48 (1979-2026)

Precipitación

24.4 mm

90% de lo normal (normal 27.1)

Cercano a lo normal

26.º más seco de 46 (1981-2026)


Récords de estación

0

Fuente: NOAA CPC / PSL, UCSB Climate Hazards Center

2 Condiciones globales y forzantes climáticos

Anomalía de la temperatura superficial del mar, Enero 2026 (°C, 1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI / PSL

Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 1+2	-0.3	0.1
Niño 3	-0.5	0.2
Niño 3.4	-0.5	0.1
Niño 4	-0.0	0.2


Promedio de los meses del periodo (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de La Niña de intensidad débil: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de NDJ 2026 fue de -0.6 °C.


Fuente: NOAA CPC

Anomalía mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Diagrama de fases de la MJO (OMI en tiempo real)



Fuente: NOAA PSL

Índices de teleconexión

Índice	Valor	Fase
PDO	-1.2	Negativa
NAO	-0.4	Neutral
TNA	0.2	Neutral

Oscilación Decadal del Pacífico (PDO); Oscilación del Atlántico Norte (NAO); Atlántico Norte Tropical (TNA).
Fuente: NOAA CPC, NOAA NCEI, NOAA PSL

La anomalía de Niño 3.4 fue de -0.54 °C (+0.07 °C respecto al periodo anterior).

La MJO estuvo activa en 25 de 31 días, sobre todo en la fase 8 (hemisferio occidental y África); amplitud media de 1.3.

Otros índices: PDO -1.24 (fase negativa); NAO -0.36 (fase neutral); TNA +0.24 (fase neutral).

3 Precipitación

Precipitación nacional

24.4 mm


90% de lo normal (normal
27.1)

Cercano a lo normal

26.º más seco de 46 (1981–
2026)


Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Precipitación acumulada




Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Porcentaje de lo normal por entidad




Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Precipitación por región

Región	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Diferencia (%)	Categoría
Noroeste	30.1	22.5	33.4	Más de lo normal
Norte	25.1	20.2	24.4	Más de lo normal
Noreste	5.7	21.3	-73.4	Mucho menos de lo normal
Centro-norte	11.5	19.4	-41.0	Menos de lo normal
Centro-occidente	14.4	20.8	-30.8	Menos de lo normal
Centro	7.5	17.4	-56.9	Menos de lo normal
Sur	25.2	31.7	-20.5	Menos de lo normal
Oriente	72.9	82.6	-11.7	Cercano a lo normal
Península de Yucatán	30.6	50.6	-39.4	Menos de lo normal

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Precipitación diaria promedio nacional



Fuente: UCSB Climate Hazards Center


Lámina diaria nacional y máximo diario en la malla

Día	Promedio nacional (mm)	Máximo en la malla (mm)	Entidad
01/01/2026	1.5	49.6	Veracruz
02/01/2026	0.1	12.5	Baja California
03/01/2026	0.1	14.7	Baja California Sur
04/01/2026	0.3	17.0	Baja California
05/01/2026	0.1	21.0	Baja California
06/01/2026	0.2	13.5	Chiapas
07/01/2026	1.4	28.6	Sonora
08/01/2026	1.4	38.7	Sonora
09/01/2026	0.2	9.7	Coahuila
10/01/2026	0.5	27.7	Coahuila
11/01/2026	1.8	125.6	Chiapas
12/01/2026	2.2	94.1	Chiapas
13/01/2026	1.2	36.2	Sinaloa
14/01/2026	0.2	14.9	Veracruz
15/01/2026	0.7	36.2	Campeche
16/01/2026	0.3	14.5	Colima
17/01/2026	0.5	23.9	Quintana Roo
18/01/2026	1.3	63.8	Quintana Roo
19/01/2026	0.6	38.5	Chiapas
20/01/2026	0.8	32.9	Sinaloa
21/01/2026	1.0	23.8	Durango
22/01/2026	0.4	12.2	Quintana Roo
23/01/2026	0.7	22.8	Sonora
24/01/2026	3.6	117.1	Sinaloa
25/01/2026	0.9	37.6	Sonora
26/01/2026	0.7	34.3	Chiapas
27/01/2026	0.8	64.3	Chiapas
28/01/2026	0.2	11.6	Veracruz
29/01/2026	0.2	15.5	Sonora
30/01/2026	0.2	14.9	Oaxaca

Día	Promedio nacional (mm)	Máximo en la malla (mm)	Entidad
31/01/2026	0.5	25.6	Chiapas

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Precipitación nacional en enero de cada año



Fuente: UCSB Climate Hazards Center

La precipitación acumulada a nivel nacional fue de 24.4 mm, el 90 % de su promedio 1991-2020 (27.1 mm), categoría «cercano a lo normal». Fue el 26.º enero más seco de la serie 1981-2026.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Noroeste (133 %) y la de menor porcentaje, Noreste (27 %).

El mayor acumulado diario en la malla se estimó el 11 de enero en Chiapas (125.6 mm).

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

4 Temperatura

Temperatura media

17.0 °C


+1.1 °C vs. normal (normal 15.9)

Por encima de la norma

2.º más cálido de 48 (1979-2026)


Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura media



Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura media por entidad




Fuente: NOAA CPC / PSL

Estaciones con mayor anomalía negativa

Región	Entidad	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Península de Yucatán	Yucatán	Progreso	2.0	-0.5

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de la temperatura media nacional en enero de cada año



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura media nacional fue de 17.0 °C, 1.1 °C por encima del promedio 1991–2020 (15.9 °C), categoría «por encima de la norma». Fue el 2.º enero más cálido de la serie 1979–2026.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noroeste (+2.3 °C) y la menor en Península de Yucatán (−0.6 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura máxima

24.3 °C


+2.1 °C vs. normal (normal 22.2)

En extremo por encima de la norma

1.º más cálido de 48 (1979–2026)

Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL


Valores extremos de la temperatura máxima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Noroeste	22.5	San Felipe Bcn, B.C.	24.1	Ejido Nuevo Leon (Obs), B.C.

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura máxima nacional



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura máxima nacional fue de 24.3 °C, 2.1 °C por encima del promedio 1991–2020 (22.2 °C), categoría «en extremo por encima de la norma». Fue el enero más cálido de la serie 1979–2026.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Centro-occidente (+3.0 °C) y la menor en Península de Yucatán (+0.4 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura mínima

9.7 °C


+0.0 °C vs. normal (normal 9.6)

Normal

16.º más cálido de 48 (1979–2026)

Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL


Valores extremos de la temperatura mínima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Noroeste	9.2	Ejido Nuevo Leon (Obs), B.C.	15.0	San Felipe Bcn, B.C.

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura mínima nacional



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura mínima nacional fue de 9.7 °C, 0.0 °C por encima del promedio 1991–2020 (9.6 °C), categoría «normal». Fue el 16.º enero más cálido de la serie 1979–2026.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noroeste (+2.0 °C) y la menor en Península de Yucatán (–1.6 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

33.5 °C

Francisco Sarabia, Chis. · 25/01/2026

Temperatura mínima más baja

3.5 °C

Ejido Nuevo Leon (Obs), B.C. · 10/01/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima más alta por entidad

Entidad	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Baja California	Ejido Nuevo Leon (Obs)	28.6	15/01/2026
Chiapas	Francisco Sarabia	33.5	25/01/2026
Yucatán	Progreso	33.0	09/01/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima más baja por entidad

Entidad	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Baja California	Ejido Nuevo Leon (Obs)	3.5	10/01/2026
Chiapas	Francisco Sarabia	15.0	03/01/2026
Veracruz	Orizaba	9.5	08/01/2026
Yucatán	Progreso	15.0	02/01/2026

Fuente: NOAA NCEI

Índices de extremos climáticos (promedio nacional)


Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
TX90p	Días cálidos (máxima > percentil 90)	32.4	10.0	22.4	%
TN90p	Noches cálidas (mínima > percentil 90)	8.4	10.0	–1.6	%
TX10p	Días frescos (máxima < percentil 10)	4.4	10.0	–5.6	%
TN10p	Noches frías (mínima < percentil 10)	9.7	10.0	–0.3	%
FD	Días con helada (mínima < 0 °C)	2.3	2.5	–0.2	d
SU	Días de verano (máxima > 25 °C)	15.4	10.7	4.8	d
TR	Noches tropicales (mínima > 20 °C)	1.4	2.3	–0.9	d
WSDI	Días en rachas cálidas (≥ 6 días)	4.4	—	—	d
CSDI	Días en rachas frías (≥ 6 días)	0.0	—	—	d

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
Rx1day	Lluvia máxima en 1 día	11.5	9.4	2.0	mm
Rx5day	Lluvia máxima en 5 días	16.9	15.6	1.3	mm
CDD	Días secos consecutivos (< 1 mm)	15.8	21.1	-5.3	d
CWD	Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)	1.8	1.6	0.2	d

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del país.

Fuente: NOAA CPC / PSL

Días con helada por entidad



Fuente: NOAA CPC / PSL

Ondas de calor y frío


Fechas	Tipo	Detalles
02/01/2026 – 09/01/2026	Onda de calor	Hasta el 71 % del país sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Norte, Noreste, Centro-norte, Centro-occidente, Centro, Sur y Oriente.

Onda: al menos 3 días consecutivos con al menos la mitad del país por encima del percentil 90 de la máxima (calor) o por debajo del percentil 10 de la mínima (frío). Se listan como máximo las 10 más intensas.

Fuente: NOAA CPC / PSL

6 Sequía


Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) al cierre de enero 2026



SPI calculado con CHIRPS; distribución gamma ajustada a los acumulados de 1991–2020.

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Porcentaje del territorio por categoría de SPI



Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Estados con el SPI-3 más bajo

Estado	SPI-1	SPI-3	SPI-6	SPI-12	Categoría
Morelos	-1.3	-2.3	1.1	1.4	Déficit extremo
Tlaxcala	-0.9	-1.6	0.3	1.6	Déficit severo
Ciudad de México	-0.9	-1.5	1.2	1.6	Déficit severo
Puebla	-1.2	-1.3	0.1	0.9	Déficit moderado
Hidalgo	-0.7	-1.3	0.0	1.6	Déficit moderado
Estado de México	-0.0	-1.2	0.1	0.9	Déficit moderado
Tamaulipas	-0.9	-1.2	-0.5	-0.0	Déficit moderado
Querétaro	-0.5	-1.1	-0.0	1.1	Déficit moderado
Guerrero	-0.1	-1.0	-0.6	0.2	Déficit moderado
San Luis Potosí	-0.4	-1.0	-0.5	0.1	Déficit moderado

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

SPI-3 (Nov 2025–Ene 2026): promedio nacional de -0.37; el 15 % del país con sequía ($SPI \leq -1.0$) y el 6 % con sequía severa o extrema.

Estados más afectados: Morelos (-2.33), Tlaxcala (-1.59) y Ciudad de México (-1.50).

SPI-1 (enero 2026): el 10 % del país con sequía.

SPI-6 (Ago 2025–Ene 2026): el 16 % del país con sequía.

SPI-12 (Feb 2025–Ene 2026): el 13 % del país con sequía.


7 Eventos notables y tiempo severo

Ningún ciclón tropical se acercó a menos de 300 km del país.



9 Perspectivas

Perspectiva para febrero 2026: tercil más probable

Precipitación




Temperatura media





Fuente: NOAA CPC

Perspectiva para Feb–Abr 2026: tercil más probable

Precipitación



Temperatura media



Fuente: NOAA CPC

Probabilidad de cada tercil por región, Feb–Abr 2026 (%)

Región	Precipitación: inferior	Precipitación: normal	Precipitación: superior	Temp.: inferior	Temp.: normal	Temp.: superior
Noroeste	40.0	35.0	25.0	18.0	26.0	56.0
Norte	32.0	36.0	32.0	7.0	25.0	68.0
Noreste	40.0	34.0	26.0	6.0	24.0	70.0
Centro-norte	26.0	35.0	38.0	8.0	24.0	68.0
Centro-occidente	26.0	34.0	39.0	12.0	22.0	66.0
Centro	28.0	35.0	38.0	12.0	28.0	60.0
Sur	29.0	33.0	38.0	17.0	32.0	51.0

Región	Precipitación: inferior	Precipitación: normal	Precipitación: superior	Temp.: inferior	Temp.: normal	Temp.: superior
Oriente	36.0	33.0	31.0	19.0	26.0	55.0
Península de Yucatán	42.0	31.0	27.0	18.0	30.0	52.0

Fuente: NOAA CPC

Perspectiva probabilística del conjunto multimodelo norteamericano (NMME), inicializada en febrero 2026, respecto a los terciles de 1991–2020. No es un pronóstico oficial: consulte al servicio meteorológico nacional.

Precipitación, febrero 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 18 % del país e inferior a lo normal en el 41 %.

Temperatura media, febrero 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 85 % del país e inferior a lo normal en el 1 %.

Precipitación, Feb–Abr 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 18 % del país e inferior a lo normal en el 13 %.

Temperatura media, Feb–Abr 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 98 % del país e inferior a lo normal en el 0 %.

10 Anexos

Regiones climáticas del reporte



Precipitación mensual por entidad (mm)

Entidad	Ene
Aguascalientes	7.0
Baja California	16.4
Baja California Sur	18.6
Campeche	29.9
Chiapas	51.1
Chihuahua	27.3
Ciudad de México	1.0
Coahuila	14.6
Colima	18.9
Durango	33.5
Guanajuato	11.7
Guerrero	5.8
Hidalgo	8.0
Jalisco	15.7
Estado de México	8.6
Michoacán	13.9
Morelos	0.1

Entidad	Ene
Nayarit	15.0
Nuevo León	7.5
Oaxaca	18.1
Puebla	9.1
Querétaro	5.8
Quintana Roo	39.6
San Luis Potosí	9.3
Sinaloa	36.9
Sonora	38.1
Tabasco	136.7
Tamaulipas	4.1
Tlaxcala	1.4
Veracruz	51.1
Yucatán	21.8
Zacatecas	13.2

CSV

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Temperatura máxima mensual por entidad (°C)

Entidad	Ene
Aguascalientes	22.8
Baja California	21.2
Baja California Sur	25.5
Campeche	28.5
Chiapas	27.8
Chihuahua	19.1
Ciudad de México	21.0
Coahuila	20.6
Colima	31.1
Durango	22.3
Guanajuato	25.1
Guerrero	32.1
Hidalgo	22.2
Jalisco	27.4
Estado de México	24.1
Michoacán	30.8
Morelos	29.0
Nayarit	28.4
Nuevo León	22.4
Oaxaca	28.9
Puebla	25.9
Querétaro	23.4
Quintana Roo	29.0
San Luis Potosí	23.2
Sinaloa	29.1
Sonora	23.5
Tabasco	27.1

Entidad	Ene
Tamaulipas	23.4
Tlaxcala	22.7
Veracruz	25.2
Yucatán	29.7
Zacatecas	20.7

CSV

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura media mensual por entidad (°C)

Entidad	Ene
Aguascalientes	14.8
Baja California	16.2
Baja California Sur	19.7
Campeche	22.6
Chiapas	22.5
Chihuahua	10.5
Ciudad de México	12.7
Coahuila	12.8
Colima	25.2
Durango	13.9
Guanajuato	16.9
Guerrero	24.6
Hidalgo	14.9
Jalisco	19.4
Estado de México	15.2
Michoacán	22.0
Morelos	19.7
Nayarit	21.2
Nuevo León	15.0
Oaxaca	21.1
Puebla	17.2
Querétaro	16.4
Quintana Roo	23.2
San Luis Potosí	15.4
Sinaloa	20.9
Sonora	16.2
Tabasco	23.4
Tamaulipas	16.7
Tlaxcala	13.2
Veracruz	20.5
Yucatán	23.3
Zacatecas	13.4

CSV

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura mínima mensual por entidad (°C)

Entidad	Ene
Aguascalientes	6.8
Baja California	11.2
Baja California Sur	14.0
Campeche	16.7
Chiapas	17.1
Chihuahua	2.0
Ciudad de México	4.5
Coahuila	4.9
Colima	19.3
Durango	5.5
Guanajuato	8.6
Guerrero	17.2
Hidalgo	7.7
Jalisco	11.3
Estado de México	6.3
Michoacán	13.3
Morelos	10.5
Nayarit	14.0
Nuevo León	7.7
Oaxaca	13.4
Puebla	8.5
Querétaro	9.4
Quintana Roo	17.5
San Luis Potosí	7.5
Sinaloa	12.8
Sonora	8.8
Tabasco	19.7
Tamaulipas	10.0
Tlaxcala	3.8
Veracruz	15.8
Yucatán	16.9
Zacatecas	6.1

CSV

Fuente: NOAA CPC / PSL

Estaciones utilizadas

Clave	Nombre	Entidad	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
MXM00076040	Ejido Nuevo Leon (Obs)	Baja California	32.4	-115.2	11.3	84.0
MXM00076055	San Felipe Bcn	Baja California	31.0	-114.8	15.0	94.0
MXM00076061	Puerto Penasco	Sonora	31.3	-113.5	62.0	0.0
MXM00076593	Progreso	Yucatán	21.3	-89.7	2.4	100.0
MXM00076737	Orizaba	Veracruz	18.9	-97.1	1259.0	0.0
MXM00076843	Francisco Sarabia	Chiapas	16.8	-93.3	1051.9	97.0

CSV

Fuente: NOAA NCEI

- Datos del reporte (JSON)
- Tablas (CSV)

11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. Récord de estación: valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: CPC_TEMP (malla diaria de 0.5°); la temperatura media es $(T_{\text{máx}} + T_{\text{mín}})/2$.

Precipitación: CHIRPS. Los promedios nacionales, regionales y estatales se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Las normales corresponden a 1991–2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. Estaciones: GHCN-Daily (NOAA NCEI); se descartan los datos marcados por su control de calidad, los valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del servicio meteorológico nacional.

Fuente	Producto	Licencia	Cita
UCSB Climate Hazards Center	CHIRPS v3.0, 0.05°	See provider terms	Climate Hazards Center, UC Santa Barbara. CHIRPS v3.0.
NOAA CPC	ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO	Public domain (NOAA)	NOAA Climate Prediction Center climate indices.
NOAA CPC / PSL	CPC Global Unified Gauge-Based Analysis of Daily Precipitation, 0.5°	Public domain (NOAA)	CPC Global Unified Precipitation data provided by NOAA PSL, Boulder, CO, USA.
NOAA CPC / PSL	CPC Global Unified Temperature, daily 0.5°	Public domain (NOAA)	CPC Global Unified Temperature data provided by NOAA PSL, Boulder, CO, USA.
NOAA NCEI / PSL	Extended Reconstructed SST v5 (ERSST v5), 2°	Public domain (NOAA)	Huang et al. (2017), J. Climate, doi:10.1175/JCLI-D-16-0836.1
GDACS	Global Disaster Alert and Coordination System event list	See provider terms	—
NOAA NCEI	GHCN-Daily	Public domain (NOAA)	Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1
NOAA NCEI	IBTrACS v04r01 tropical-cyclone best tracks	Public domain (NOAA)	Knapp et al. (2010), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/2009BAMS2755.1
NOAA NCEI	Pacific Decadal Oscillation index (ERSST v5)	Public domain (NOAA)	—
NOAA CPC	North American Multi-Model Ensemble (NMME) tercile probabilities, 1°	Public domain (NOAA)	Kirtman et al. (2014), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/BAMS-D-12-00050.1
NOAA PSL	Real-time OLR MJO Index (ROMI)	Public domain (NOAA)	Kiladis et al. (2014), Mon. Wea. Rev., doi:10.1175/MWR-D-13-00301.1
NOAA PSL	Tropical Northern Atlantic index (TNA)	Public domain (NOAA)	Enfield et al. (1999), J. Geophys. Res., doi:10.1029/1999JC900039
geoBoundaries	geoBoundaries gbOpen (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI))	Creative Commons Attribution 3.0 Intergovernmental Organisations (CC BY 3.0 IGO)	—

Generado por ClimaBulletin (climabulletin.org), código abierto. Comentarios: abra un issue en el repositorio del proyecto.

Reporte del clima – México – Enero 2026 · MEX-M-2026-01 · Generado con ClimaBulletin 0.1.0 · CC BY 4.0