

Semana 38 de 2026 (14–20 de septiembre)

Final Emitido el 11/10/2026 · Normal 1991–2020 · próxima actualización 12/10/2026

1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media nacional de 26.5 °C (+1.9 °C respecto a 1991–2020): la 2.^a semana 38 más cálida de la serie 1979–2026.
- Precipitación nacional de 22.7 mm, 71 % de lo normal: la 17.^a semana 38 más seca de la serie 1979–2026.
- La temperatura máxima más alta en estaciones GHCN fue de 39.8 °C en Ciudad Constitucion, B.C.S. el 18 de septiembre.
- La mayor lluvia en 24 h en estaciones GHCN fue de 94.6 mm en La Paz (City), B.C.S. el 16 de septiembre.
- Se superaron 5 récords de estación (registro de al menos 20 años).
- La temperatura máxima superó su percentil 90 en el 66 % de los días (promedio nacional; lo esperado es 10 %).
- Ondas de calor de alcance nacional: 1; ondas frías: 0.
- Condiciones de El Niño de intensidad fuerte en el Pacífico ecuatorial (ONI JJA 2026: +1.8 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura media

26.5 °C

+1.9 °C vs. normal (normal 24.6)

Muy por encima de la norma

2.º más cálido de 48 (1979–2026)

Temperatura máxima

33.0 °C

+3.3 °C vs. normal (normal 29.7)

En extremo por encima de la norma

2.º más cálido de 48 (1979–2026)

Temperatura mínima

20.0 °C

+0.5 °C vs. normal (normal 19.5)

Ligeramente por encima de la norma

9.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 2001, 2005, 2010, 2017)

Precipitación

22.7 mm

71% de lo normal (normal 31.9)

Menos de lo normal

17.º más seco de 48 (1979–2026)

Récords de estación

5

Fuente: NOAA CPC / PSL

2 Condiciones globales y forzantes climáticos

Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 1+2	4.6	0.0
Niño 3	3.8	0.1
Niño 3.4	3.0	0.2
Niño 4	1.0	0.2


Promedio semanal (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de El Niño de intensidad fuerte: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de JJA 2026 fue de +1.8 °C.


Fuente: NOAA CPC

Anomalia mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Diagrama de fases de la MJO (OMI en tiempo real)



Fuente: NOAA PSL

La anomalía de Niño 3.4 fue de +3.00 °C (+0.20 °C respecto al periodo anterior).

La MJO estuvo débil o inactiva (amplitud menor que 1 todos los días; media de 0.9).

3 Precipitación

Precipitación nacional

22.7 mm


71% de lo normal (normal
31.9)

Menos de lo normal

17.º más seco de 48 (1979–
2026)


Fuente: NOAA CPC / PSL

Precipitación acumulada



Fuente: NOAA CPC / PSL

Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

Precipitación por región

Región	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Diferencia (%)	Categoría
Noroeste	24.0	14.4	66.7	Mucho más de lo normal
Norte	16.3	19.0	-14.3	Cercano a lo normal
Noreste	10.5	40.5	-74.2	Mucho menos de lo normal
Centro-norte	13.6	25.3	-46.2	Menos de lo normal
Centro-occidente	22.9	39.2	-41.7	Menos de lo normal
Centro	19.3	39.0	-50.4	Menos de lo normal
Sur	29.6	60.2	-50.8	Menos de lo normal
Oriente	37.1	61.8	-39.9	Menos de lo normal
Península de Yucatán	45.7	42.0	8.8	Cercano a lo normal

Fuente: NOAA CPC / PSL

Estaciones con mayor exceso de precipitación

Región	Entidad	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Noroeste	Baja California Sur	La Paz (City)	18.0	2297.3
Norte	Coahuila	Saltillo	1790.0	745.2
Noroeste	Baja California Sur	Ciudad Constitucion	48.0	732.8
Centro	Hidalgo	Tulancingo	2181.0	533.8
Norte	Durango	Durango	1872.0	278.0
Sur	Chiapas	Comitan	1646.0	114.8

Región	Entidad	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Centro	Tlaxcala	Tlaxcala De Xicontecatl (Dge)	2230.0	50.0
Noroeste	Sinaloa	Colonia Juan Carras	4.0	37.7
Oriente	Veracruz	Jalapa	1389.0	29.9
Norte	Chihuahua	Temosachi (Obs)	1932.0	26.7

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor déficit de precipitación

Región	Entidad	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Noroeste	Baja California	Ejido Nuevo Leon (Obs)	11.0	-100.0
Península de Yucatán	Yucatán	Progreso	2.0	-100.0
Sur	Chiapas	Tapachula	118.0	-76.9
Centro-norte	San Luis Potosí	Rio Verde	983.0	-71.7
Noreste	Tamaulipas	Tampico	25.0	-66.2
Centro	Estado de México	Toluca (Obs)	2726.0	-48.9


Fuente: NOAA NCEI

Mayores lluvias en 24 horas en estaciones

Estación	Entidad	Lluvia máxima en 24 h (mm)	Fecha
La Paz (City)	Baja California Sur	94.6	16/09/2026
Ciudad Constitucion	Baja California Sur	55.8	16/09/2026
Villahermosa	Tabasco	53.7	19/09/2026
Zacatecas Zac. (La Bufa	Zacatecas	50.8	16/09/2026
Saltillo	Coahuila	45.4	16/09/2026
Colonia Juan Carras	Sinaloa	43.2	17/09/2026
Tuxpan.Ver.	Veracruz	39.6	19/09/2026
Tulancingo	Hidalgo	35.0	16/09/2026
Comitan	Chiapas	31.0	14/09/2026
Ciudad Victoria	Tamaulipas	27.4	20/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Precipitación diaria promedio nacional



Fuente: NOAA CPC / PSL

La precipitación acumulada a nivel nacional fue de 22.7 mm, el 71 % de su promedio 1991–2020 (31.9 mm), categoría «menos de lo normal». Fue la 17.^a semana 38 más seca de la serie 1979–2026.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Noroeste (167 %) y la de menor porcentaje, Noreste (26 %).

El mayor acumulado diario en la malla se estimó el 16 de septiembre en Chihuahua (146.7 mm).

Fuente: NOAA CPC / PSL

4 Temperatura

Temperatura media

26.5 °C


+1.9 °C vs. normal (normal
24.6)

Muy por encima de la norma

2.º más cálido de 48 (1979–
2026)


Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura media



Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

Estaciones con mayor anomalía positiva

Región	Entidad	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Noroeste	Sinaloa	Colonia Juan Carras	4.0	0.4

Fuente: NOAA NCEI

La temperatura media nacional fue de 26.5 °C, 1.9 °C por encima del promedio 1991–2020 (24.6 °C), categoría «muy por encima de la norma». Fue la 2.ª semana 38 más cálida de la serie 1979–2026.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noreste (+3.3 °C) y la menor en Oriente (+1.0 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura máxima

33.0 °C


+3.3 °C vs. normal (normal 29.7)

En extremo por encima de la norma

2.º más cálido de 48 (1979–2026)

Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL


Valores extremos de la temperatura máxima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Noroeste	34.7	Colonia Juan Carras, Sin.	35.8	Ciudad Constitucion, B.C.S.

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura máxima nacional



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura máxima nacional fue de 33.0 °C, 3.3 °C por encima del promedio 1991–2020 (29.7 °C), categoría «en extremo por encima de la norma». Fue la 2.ª semana 38 más cálida de la serie 1979–2026.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noreste (+5.1 °C) y la menor en Noroeste (+1.4 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura mínima

20.0 °C


+0.5 °C vs. normal (normal 19.5)

Ligeramente por encima de la norma

9.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 2001, 2005, 2010, 2017)

Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL


Valores extremos de la temperatura mínima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Oriente	13.8	Jalapa, Ver.	21.4	Tuxpan, Ver., Ver.

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura mínima nacional



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura mínima nacional fue de 20.0 °C, 0.5 °C por encima del promedio 1991–2020 (19.5 °C), categoría «ligeramente por encima de la norma». Fue la 9.ª semana 38 más cálida de la serie 1979–2026 (empatado con 2001, 2005, 2010, 2017).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Norte (+1.8 °C) y la menor en Centro (–1.0 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

39.8 °C

Ciudad Constitucion, B.C.S. · 18/09/2026

Temperatura mínima más baja

11.2 °C

Jalapa, Ver. · 17/09/2026

Máxima lluvia en 24 h

94.6 mm

La Paz (City), B.C.S. · 16/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima más alta por entidad

Entidad	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Baja California Sur	Ciudad Constitucion	39.8	18/09/2026
Chiapas	Comitan	33.9	14/09/2026
Durango	Durango	37.6	18/09/2026
Jalisco	Guadalajara	34.4	17/09/2026
Michoacán	Zamora	36.0	18/09/2026
Sinaloa	Colonia Juan Carras	38.0	17/09/2026
Tamaulipas	Tampico	38.6	17/09/2026
Veracruz	Tuxpan.Ver.	38.4	18/09/2026
Yucatán	Valladolid	35.4	16/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima más baja por entidad

Entidad	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Chiapas	Comitan	11.7	16/09/2026
Guerrero	Chilpancingo Ro.	12.8	19/09/2026
Sinaloa	Choix	18.4	18/09/2026
Tamaulipas	Tampico	15.8	17/09/2026
Veracruz	Jalapa	11.2	17/09/2026
Yucatán	Valladolid	22.1	20/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Récords de estación superados

Estación	Entidad	Variable	Nuevo valor	Fecha	Récord anterior	Fecha anterior
Durango	Durango	Temperatura máxima más alta	37.6	18/09/2026	37.4	26/09/2023

Estación	Entidad	Variable	Nuevo valor	Fecha	Récord anterior	Fecha anterior
Colonia Juan Carras	Sinaloa	Temperatura máxima más alta	38.0	17/09/2026	36.8	05/09/2023
Tampico	Tamaulipas	Temperatura mínima más baja	15.8	17/09/2026	17.0	30/09/2020
Guadalajara	Jalisco	Temperatura máxima más alta	34.4	17/09/2026	32.7	13/09/2023
Comitan	Chiapas	Temperatura máxima más alta	33.9	14/09/2026	32.4	01/09/1992

Valor diario más extremo del periodo frente al mismo periodo de todos los años previos del registro (al menos 20 años; para las semanas, el mismo mes).

Fuente: NOAA NCEI

Índices de extremos climáticos (promedio nacional)

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
TX90p	Días cálidos (máxima > percentil 90)	66.1	10.0	56.1	%
TN90p	Noches cálidas (mínima > percentil 90)	16.0	10.0	6.0	%
TX10p	Días frescos (máxima < percentil 10)	0.2	10.0	-9.8	%
TN10p	Noches frías (mínima < percentil 10)	5.6	10.0	-4.4	%
FD	Días con helada (mínima < 0 °C)	0.0	0.0	-0.0	d
SU	Días de verano (máxima > 25 °C)	6.8	5.8	1.0	d
TR	Noches tropicales (mínima > 20 °C)	3.8	3.3	0.5	d
WSDI	Días en rachas cálidas (≥ 6 días)	2.4	—	—	d
CSDI	Días en rachas frías (≥ 6 días)	0.0	—	—	d
Rx1day	Lluvia máxima en 1 día	12.6	15.6	-3.0	mm
Rx5day	Lluvia máxima en 5 días	20.6	28.6	-8.0	mm
CDD	Días secos consecutivos (< 1 mm)	3.5	3.4	0.1	d
CWD	Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)	2.0	2.4	-0.4	d

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del país.

Fuente: NOAA CPC / PSL

Ondas de calor y frío

Fechas	Tipo	Detalles
14/09/2026 – 20/09/2026	Onda de calor	Hasta el 72 % del país sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Norte, Noreste, Centro-norte, Centro-occidente, Centro, Sur, Oriente y Península de Yucatán.

Onda: al menos 3 días consecutivos con al menos la mitad del país por encima del percentil 90 de la máxima (calor) o por debajo del percentil 10 de la mínima (frío). Se listan como máximo las 10 más intensas.

Fuente: NOAA CPC / PSL

6 Sequía

El SPI se calcula con acumulados mensuales; consulte el reporte mensual más reciente (índice SPI).

7 Eventos notables y tiempo severo

Eventos notables

Fechas	Tipo	Detalles
21/04/2026 – 09/10/2026	Sequía	Alerta Orange de GDACS: Drought in The Bahamas, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Guatemala, Honduras, Haiti, Mexico, Nicaragua, El Salvador.

Alertas de GDACS y lluvias de 150 mm o más en 24 horas en estaciones (tras el control de calidad).

Fuente: GDACS

Ningún ciclón tropical se acercó a menos de 300 km del país.

9 Perspectivas

Los reportes semanales aún no incluyen un pronóstico; consulte la perspectiva del reporte mensual más reciente (pronóstico estacional NMME).

11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. Récord de estación: valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: CPC_TEMP (malla diaria de 0.5°); la temperatura media es (Tmáx + Tmín)/2.

Precipitación: CPC. Los promedios nacionales, regionales y estatales se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Las normales corresponden a 1991–2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. Estaciones: GHCN-Daily (NOAA NCEI); se descartan los datos marcados por su control de calidad, los valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del servicio meteorológico nacional.

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA CPC	ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO	Public domain (NOAA)	NOAA Climate Prediction Center climate indices.
NOAA CPC / PSL	CPC Global Unified Gauge-Based Analysis of Daily Precipitation, 0.5°	Public domain (NOAA)	CPC Global Unified Precipitation data provided by NOAA PSL, Boulder, CO, USA.
NOAA CPC / PSL	CPC Global Unified Temperature, daily 0.5°	Public domain (NOAA)	CPC Global Unified Temperature data provided by NOAA PSL, Boulder, CO, USA.
GDACS	Global Disaster Alert and Coordination System event list	See provider terms	—

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA NCEI	GHCN-Daily	Public domain (NOAA)	Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1
NOAA NCEI	IBTrACS v04r01 tropical-cyclone best tracks	Public domain (NOAA)	Knapp et al. (2010), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/2009BAMS2755.1
NOAA PSL	Real-time OLR MJO Index (ROMI)	Public domain (NOAA)	Kiladis et al. (2014), Mon. Wea. Rev., doi:10.1175/MWR-D-13-00301.1
geoBoundaries	geoBoundaries gbOpen (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI))	Creative Commons Attribution 3.0 Intergovernmental Organisations (CC BY 3.0 IGO)	—

Generado por ClimaBulletin (climabulletin.org), código abierto. Comentarios: abra un issue en el repositorio del proyecto.