

Semana 39 de 2026 (21–27 de septiembre)

Final Emitido el 11/10/2026 · Normal 1991–2020 · próxima actualización 14/10/2026

1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media nacional de 25.9 °C (+1.7 °C respecto a 1991–2020): la 2.^a semana 39 más cálida de la serie 1979–2026.
- Precipitación nacional de 29.6 mm, 95 % de lo normal: la 27.^a semana 39 más seca de la serie 1979–2026.
- La temperatura máxima más alta en estaciones GHCN fue de 39.8 °C en La Paz (City), B.C.S. el 26 de septiembre.
- La mayor lluvia en 24 h en estaciones GHCN fue de 59.0 mm en Oaxaca, Oax. el 24 de septiembre.
- Se superaron 2 récords de estación (registro de al menos 20 años).
- La temperatura máxima superó su percentil 90 en el 55 % de los días (promedio nacional; lo esperado es 10 %).
- 1 ciclones tropicales pasaron a menos de 300 km del país, sin tocar tierra.
- Condiciones de El Niño de intensidad fuerte en el Pacífico ecuatorial (ONI JJA 2026: +1.8 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura media

25.9 °C

+1.7 °C vs. normal (normal 24.2)

Muy por encima de la norma

2.º más cálido de 48 (1979–2026)

Temperatura máxima

32.1 °C

+2.6 °C vs. normal (normal 29.5)

En extremo por encima de la norma

2.º más cálido de 48 (1979–2026)

Temperatura mínima

19.7 °C

+0.8 °C vs. normal (normal 18.9)

Ligeramente por encima de la norma

3.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 2005, 2024, 2025)

Precipitación

29.6 mm

96% de lo normal (normal 31.0)

Cercano a lo normal

27.º más seco de 48 (1979–2026)

Récords de estación

2

Fuente: NOAA CPC / PSL

2 Condiciones globales y forzantes climáticos

Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 1+2	4.7	0.1
Niño 3	3.9	0.1
Niño 3.4	3.1	0.1
Niño 4	1.1	0.1


Promedio semanal (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de El Niño de intensidad fuerte: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de JJA 2026 fue de +1.8 °C.


Fuente: NOAA CPC

Anomalia mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Diagrama de fases de la MJO (OMI en tiempo real)



Fuente: NOAA PSL

La anomalía de Niño 3.4 fue de +3.10 °C (+0.10 °C respecto al periodo anterior).

La MJO estuvo débil o inactiva (amplitud menor que 1 todos los días; media de 0.7).

3 Precipitación

Precipitación nacional

29.6 mm


96% de lo normal (normal
31.0)

Cercano a lo normal

27.º más seco de 48 (1979–
2026)


Fuente: NOAA CPC / PSL

Precipitación acumulada



Fuente: NOAA CPC / PSL

Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

Precipitación por región

Región	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Diferencia (%)	Categoría
Noroeste	15.0	10.2	46.6	Más de lo normal
Norte	26.9	13.1	106.0	Mucho más de lo normal
Noreste	13.6	29.1	-53.3	Menos de lo normal
Centro-norte	12.0	18.2	-34.3	Menos de lo normal
Centro-occidente	26.0	30.0	-13.3	Cercano a lo normal
Centro	19.5	39.5	-50.6	Menos de lo normal
Sur	66.5	67.6	-1.6	Cercano a lo normal
Oriente	54.6	89.1	-38.7	Menos de lo normal
Península de Yucatán	48.4	65.8	-26.5	Menos de lo normal

Fuente: NOAA CPC / PSL

Estaciones con mayor exceso de precipitación

Región	Entidad	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Norte	Coahuila	Saltillo	1790.0	2329.5
Noroeste	Baja California Sur	La Paz (City)	18.0	863.1
Norte	Durango	Durango	1872.0	481.3
Centro-norte	San Luis Potosí	Rio Verde	983.0	271.8
Noroeste	Baja California Sur	Ciudad Constitucion	48.0	254.6
Centro-occidente	Michoacán	Morelia	1913.0	204.6

Región	Entidad	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Noreste	Tamaulipas	Ciudad Victoria	355.0	203.9
Norte	Chihuahua	Temosachi (Obs)	1932.0	44.3

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor déficit de precipitación

Región	Entidad	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Noroeste	Baja California	Ejido Nuevo Leon (Obs)	11.0	-100.0
Sur	Chiapas	Tapachula	118.0	-86.0
Centro	Tlaxcala	Tlaxcala De Xicontecatl (Dge)	2230.0	-71.3
Centro	Estado de México	Toluca (Obs)	2726.0	-58.3
Oriente	Veracruz	Jalapa	1389.0	-27.9
Oriente	Veracruz	Hacienda Ylang Ylang Veracruz	16.0	-26.8
Noreste	Tamaulipas	Tampico	25.0	-3.5


Fuente: NOAA NCEI

Mayores lluvias en 24 horas en estaciones

Estación	Entidad	Lluvia máxima en 24 h (mm)	Fecha
Oaxaca	Oaxaca	59.0	24/09/2026
Ciudad Victoria	Tamaulipas	56.1	23/09/2026
Colotlan	Jalisco	50.7	23/09/2026
Chilpancingo Ro.	Guerrero	47.7	26/09/2026
La Paz (City)	Baja California Sur	46.3	23/09/2026
Zamora	Michoacán	45.4	26/09/2026
Morelia	Michoacán	45.4	26/09/2026
Durango	Durango	44.2	25/09/2026
Villahermosa	Tabasco	40.3	26/09/2026
Rio Verde	San Luis Potosí	39.8	24/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Precipitación diaria promedio nacional



Fuente: NOAA CPC / PSL

La precipitación acumulada a nivel nacional fue de 29.6 mm, el 95 % de su promedio 1991–2020 (31.0 mm), categoría «cercano a lo normal». Fue la 27.^a semana 39 más seca de la serie 1979–2026.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Norte (206 %) y la de menor porcentaje, Noreste (47 %).

El mayor acumulado diario en la malla se estimó el 27 de septiembre en Nayarit (143.8 mm).

Fuente: NOAA CPC / PSL

4 Temperatura

Temperatura media

25.9 °C


+1.7 °C vs. normal (normal 24.2)

Muy por encima de la norma

2.º más cálido de 48 (1979–2026)


Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura media



Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura media nacional fue de 25.9 °C, 1.7 °C por encima del promedio 1991–2020 (24.2 °C), categoría «muy por encima de la norma». Fue la 2.ª semana 39 más cálida de la serie 1979–2026.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noreste (+3.4 °C) y la menor en Oriente (+0.2 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura máxima

32.1 °C


+2.6 °C vs. normal (normal 29.5)

En extremo por encima de la norma

2.º más cálido de 48 (1979–2026)

Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL


Valores extremos de la temperatura máxima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Oriente	30.4	Orizaba, Ver.	31.3	Coatzacoalcos, Ver.

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura máxima nacional



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura máxima nacional fue de 32.1 °C, 2.6 °C por encima del promedio 1991–2020 (29.5 °C), categoría «en extremo por encima de la norma». Fue la 2.ª semana 39 más cálida de la serie 1979–2026.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noreste (+4.7 °C) y la menor en Oriente (+1.4 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura mínima

19.7 °C


+0.8 °C vs. normal (normal 18.9)

Ligeramente por encima de la norma

3.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 2005, 2024, 2025)

Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL


Valores extremos de la temperatura mínima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Noroeste	21.2	Choix, Sin.	25.0	La Paz (City), B.C.S.
Península de Yucatán	24.7	Valladolid, Yuc.	25.1	Progreso, Yuc.

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura mínima nacional



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura mínima nacional fue de 19.7 °C, 0.8 °C por encima del promedio 1991–2020 (18.9 °C), categoría «ligeramente por encima de la norma». Fue la 3.ª semana 39 más cálida de la serie 1979–2026 (empatado con 2005, 2024, 2025).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noreste (+2.2 °C) y la menor en Oriente (–1.0 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

39.8 °C

La Paz (City), B.C.S. · 26/09/2026

Temperatura mínima más baja

11.4 °C

Comitan, Chis. · 22/09/2026

Máxima lluvia en 24 h

59.0 mm

Oaxaca, Oax. · 24/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima más alta por entidad

Entidad	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Baja California Sur	La Paz (City)	39.8	26/09/2026
Chiapas	Sn. Cristobal Las Casas	31.6	21/09/2026

Entidad	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Coahuila	Saltillo	35.3	24/09/2026
Jalisco	Ciudad Guzman	34.2	26/09/2026
Oaxaca	Oaxaca	33.0	26/09/2026
San Luis Potosí	Rio Verde	39.5	21/09/2026
Sinaloa	Colonia Juan Carras	36.8	26/09/2026
Tamaulipas	Tampico	36.4	21/09/2026
Veracruz	Coatzacoalcos	35.5	22/09/2026
Yucatán	Valladolid	36.2	23/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima más baja por entidad

Entidad	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Baja California Sur	La Paz (City)	17.7	27/09/2026
Chiapas	Comitan	11.4	22/09/2026
Sinaloa	Choix	14.0	23/09/2026
Tamaulipas	Tampico	18.0	25/09/2026
Veracruz	Orizaba	12.1	27/09/2026
Yucatán	Valladolid	23.8	21/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Récords de estación superados

Estación	Entidad	Variable	Nuevo valor	Fecha	Récord anterior	Fecha anterior
Guadalajara	Jalisco	Temperatura máxima más alta	34.0	27/09/2026	32.7	13/09/2023
Orizaba	Veracruz	Temperatura máxima más alta	32.4	25/09/2026	31.1	01/09/2020

Valor diario más extremo del periodo frente al mismo periodo de todos los años previos del registro (al menos 20 años; para las semanas, el mismo mes).

Fuente: NOAA NCEI

Índices de extremos climáticos (promedio nacional)

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
TX90p	Días cálidos (máxima > percentil 90)	55.1	10.0	45.1	%
TN90p	Noches cálidas (mínima > percentil 90)	16.3	10.0	6.3	%
TX10p	Días frescos (máxima < percentil 10)	1.5	10.0	-8.5	%
TN10p	Noches frías (mínima < percentil 10)	1.9	10.0	-8.1	%
FD	Días con helada (mínima < 0 °C)	0.0	0.0	-0.0	d
SU	Días de verano (máxima > 25 °C)	6.6	5.6	1.0	d
TR	Noches tropicales (mínima > 20 °C)	3.6	3.0	0.6	d
WSDI	Días en rachas cálidas (≥ 6 días)	1.2	—	—	d
CSDI	Días en rachas frías (≥ 6 días)	0.0	—	—	d
Rx1day	Lluvia máxima en 1 día	14.9	15.1	-0.1	mm
Rx5day	Lluvia máxima en 5 días	27.0	28.1	-1.1	mm
CDD	Días secos consecutivos (< 1 mm)	3.1	3.7	-0.6	d
CWD	Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)	2.5	2.3	0.3	d

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del país.

6 Sequía

El SPI se calcula con acumulados mensuales; consulte el reporte mensual más reciente (índice SPI).

7 Eventos notables y tiempo severo

Trayectorias de ciclones tropicales cercanos



Trayectorias completas; categoría de Saffir-Simpson según el NHC/JTWC. Fuente: IBTrACS v04 (datos provisionales para las temporadas recientes).

Fuente: NOAA NCEI

Ciclones tropicales a menos de 300 km del país

Nombre	Cuenca	Intensidad máxima	Viento máximo (km/h)	Inicio	Fin	Distancia mínima (km)	Impacto en tierra	Intensidad al impacto
Polo	Pacífico nororiental	Huracán categoría 5	287	17/09/2026	30/09/2026	115	—	—

Fuente: NOAA NCEI

Eventos notables

Fechas	Tipo	Detalles
21/04/2026 – 09/10/2026	Sequía	Alerta Orange de GDACS: Drought in The Bahamas, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Guatemala, Honduras, Haiti, Mexico, Nicaragua, El Salvador.

Alertas de GDACS y lluvias de 150 mm o más en 24 horas en estaciones (tras el control de calidad).

Fuente: GDACS

Ciclones tropicales a menos de 300 km del país: 1 (Polo).

9 Perspectivas

Los reportes semanales aún no incluyen un pronóstico; consulte la perspectiva del reporte mensual más reciente (pronóstico estacional NMME).

11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. Récord de estación: valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: CPC_TEMP (malla diaria de 0.5°); la temperatura media es (Tmáx + Tmín)/2.
Precipitación: CPC. Los promedios nacionales, regionales y estatales se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Las normales corresponden a 1991-2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. Estaciones: GHCN-Daily (NOAA NCEI); se descartan los datos marcados por su control de calidad, los valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del servicio meteorológico nacional.

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA CPC	ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO	Public domain (NOAA)	NOAA Climate Prediction Center climate indices.
NOAA CPC / PSL	CPC Global Unified Gauge-Based Analysis of Daily Precipitation, 0.5°	Public domain (NOAA)	CPC Global Unified Precipitation data provided by NOAA PSL, Boulder, CO, USA.
NOAA CPC / PSL	CPC Global Unified Temperature, daily 0.5°	Public domain (NOAA)	CPC Global Unified Temperature data provided by NOAA PSL, Boulder, CO, USA.
GDACS	Global Disaster Alert and Coordination System event list	See provider terms	—
NOAA NCEI	GHCN-Daily	Public domain (NOAA)	Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1
NOAA NCEI	IBTrACS v04r01 tropical-cyclone best tracks	Public domain (NOAA)	Knapp et al. (2010), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/2009BAMS2755.1

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA PSL	Real-time OLR MJO Index (ROMI)	Public domain (NOAA)	Kiladis et al. (2014), Mon. Wea. Rev., doi:10.1175/MWR-D-13-00301.1
geoBoundaries	geoBoundaries gbOpen (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI))	Creative Commons Attribution 3.0 Intergovernmental Organisations (CC BY 3.0 IGO)	—

Generado por [ClimaBulletin \(climabulletin.org\)](https://climabulletin.org), código abierto. Comentarios: abra un issue en el repositorio del proyecto.